

โรคพิษสุนัขบ้า



อันตราย! แต่ป้องกันได้

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาท จากสัตว์สู่คน เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่สุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หนู กระต่าย เป็นต้น



ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มี ยารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

อาการที่พบในคนหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า



เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคัน รุนแรงบริเวณที่ถูกกัด



กระสับ กระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ



แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เกร็ง อัมพาต หมสติ และเสียชีวิต

อาการที่พบในสุนัขหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

ระยะแรก

สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัย เปลี่ยนไปจากเดิม




ระยะที่ ๒

มีอาการที่ทางประสาท คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย ตื่นเต้น ไม่อยู่นิ่ง



ระยะที่ ๓

มีอาการทางตก น้ำลายไหล ขาอ่อน ทรงตัวไม่ได้ล้มลง อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็ว และตายในที่สุด



คำแนะนำสำหรับคนเลี้ยงสุนัข

๑. คุณกำเนิดไม่ให้มีสุนัขมากเกินไป
๒. ไม่ปล่อยสุนัขในที่สาธารณะ
๓. นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี

นำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนได้ที่ อปท. ทั่วประเทศ



ขั้นตอนการป้องกันการติดเชื้อในคน

พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกสัตว์กัด ทำร้าย



หลังโดนกัด รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อเข้ารับการรักษา



รับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล หรือ รพ.สต. ใกล้บ้าน



โรคพิษสุนัขบ้า



กลุ่มเสี่ยง



อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี



ถูกกัด ข่วน

แล้วไม่ไปฉีดวัคซีน

การติดต่อของโรค

ถูกสัตว์มีเชื้อ

กัด

ข่วน

เลียบาดแผล



อาการผู้ป่วย

เบื่ออาหาร เจ็บคอ

มีไข้ อ่อนเพลีย



กลัวลม

กลืนลำบาก กลืนน้ำ

คั่นรุนแรง

บริเวณที่เคยถูกกัด

อัมพาตตาย

ดูอย่างไรว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะแรก

ระยะต้นต้น

ระยะอัมพาต

- บดขยี้เปลี่ยน ไม่รุนแรง
- หงุดหงิด เกือบตัว
- หวาดระแวง ปานตาขยาย

- กระวนกระวาย
- กัดไม่เลือก
- เห่าหอน

- น้ำลายไหล
- คางห้อยตก
- ล้มลง ตาย

เกิดจากเชื้อ เรบีสไวรัส (RABIES VIRUS) มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หมู หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค


ผู้ติดเชื้อจะมีอาการ ตาย ๑๐๐%

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกกัด - ข่วน-เลีย



ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด

หลาย ๆ ครั้ง



กักหมา - แมว

เพื่อสังเกตอาการ ๑๐ วัน



ใส่ยา เบตาดีน



หาหมอหากฉีดวัคซีนต้อง

มาตามนัดทุกครั้ง

*****คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง*****



ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



ออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง



ฝึกให้ เชื่อฟังคำสั่ง



ทำหมัน คุมกำเนิด

๑. อย่าแหยม

๒. อย่าเหยียบ

๓. อย่าแยก

๔. อย่าหยิบ

๕. อย่ายุ่ง

คาถา
๕ย

กันสุนัขกัด



ทำให้สุนัขโกรธ

หาง หัว ตัว ขา
ให้สุนัขตกใจ



สุนัขที่กัดกันด้วยมือ
อย่า



อาหารที่สุนัขกำลังกิน



กับสุนัขที่ไม่รู้จักร
หรือไม่มีเจ้าของ



กลุ่มงานป้องกันโรค กองสาธารณสุขท้องถิ่น

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค